

Регламент применения Гамаир, таб.

| Культура (группа культур) | Целевой объект | Норма расхода препарата, табл./100 м ² | Норма расхода рабочей жидкости, л/100 м ² | Кратность обработок | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания | Сроки выхода на обработанные участки руч.(мех.) |
|---|--|---|--|---------------------|--|---------------|---|
| Томаты открытого и защищенного грунта | Бактериальный рак (<i>Clavibacter michiganense subsp. michiganensis</i>) | 20 (Л) | 100 | 1 | Пролив почвы суспензией препарата в период вегетации | - | -(-) |
| | белая (<i>Sclerotinia Libertiana Fuck.</i>), серая (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>) гнили. | 10 (Л) | 50 | 3 | Опрыскивание суспензией препарата в период вегетации | - | 1(-) |
| Огурец открытого и защищенного грунта | Корневая (<i>Fusarium oxysporum Schl.</i>) | 20 (Л) | 100 | 1 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | - | -(-) |
| | серая гниль (<i>Botrytis cinerea Pers.</i>). | 10 (Л) | 50 | 2 | Опрыскивание суспензией препарата в период вегетации | - | 1(-) |
| Яблоня | Парша(<i>Venturia inaequalis (Cooke) Wint</i>), монилиоз (<i>Monilia fructigena</i>) | 10 (Л) | 50 | 3 | Опрыскивание суспензией препарата в период вегетации | - | 1(-) |
| Капуста белокачанная | слизистая гниль (<i>Erwinia carotovora Holland</i>), корневая гниль (<i>Rhizoctonia aderholdii (Ruhl.) Kolosch, Pythium, Fusarium</i>). | 20 (Л) | 100 | 1 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | - | -(-) |
| Морковь | Белая гниль (<i>Sclerotinia sclerotiorum (Lib) dBy</i>) слизистый бактериоз (<i>Erwinia carotovora Holland</i>), фомоз (<i>Phoma rostrupii Sacc.</i>). | 20 (Л) | 100 | 1 | Пролив грунта за 1-3 суток до высева семян | - | -(-) |
| Горшечные цветочные культуры защищенного грунта | Пятнистости) (<i>Septoria, Alternaria</i>) | 2 табл./м ² | 1 л/м ² | многократно | Опрыскивание растений в период вегетации | - | 1(-) |
| | Корневые гнили (<i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium</i>), увядания (<i>Verticillium</i>) | 1 табл./м ² | 5л/м ² | многократно | Полив почвы в горшках | - | -(-) |

| Культура (группа культур) | Целевой объект | Норма расхода препарата, табл./100 м ² | Норма расхода рабочей жидкости, л/100 м ² | Кратность обработок | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания | Сроки выхода на обработанные участки руч.(мех.) |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------|---|
| Цветочные культуры открытого грунта | Пятнистости (<i>Septoria, Alternaria</i>) | 2 табл./10м ² | 1л/10м ² | многократно | Опрыскивание растений в период вегетации | - | 1(-) |
| | Корневые гнили (<i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium</i>), увядания (<i>Verticillium</i>) | 1 табл./м ² | 5л/м ² | многократно | Полив почвы под растениями | - | -(-) |
| Комнатные цветочные растения | Пятнистости (<i>Septoria, Alternaria</i>) | 2 табл./1 л воды (Л) | 0,1-0,2 л/ м ² | многократно | Опрыскивание растений в период вегетации | - | 1(-) |
| | Корневые гнили (<i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium</i>), увядания (<i>Verticillium</i>) | 1 табл./5 л воды (Л) | 0,2-1л/1 горшок | многократно | Полив почвы в горшках | - | -(-) |
| Цветочные растения открытого грунта | Пятнистости (<i>Septoria, Alternaria</i>) | 2 табл./10 м ² (Л) | 1-2 л/10 м ² | многократно | Опрыскивание растений в период вегетации | - | 1(-) |
| | Корневые гнили (<i>Pythium, Rhizoctonia, Fusarium</i>), увядания (<i>Verticillium</i>) | 1 табл./м ² (Л) | 5л/м ² | многократно | Полив почвы под корень растения | - | -(-) |

